



Sotalol

Date de création  
18 Mars 2019

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 1. QU'EST-CE *LE SOTALOL* ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Indications thérapeutiques

Le Sotalol est un bêtabloquant antiarythmique. Il régule le cœur afin que les battements du cœur de votre enfant soient plus lents, plus stables et moins forts.

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER *LE SOTALOL* ?

### Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être donné en cas d'asthme, d'insuffisance cardiaque non contrôlée, d'artérite, d'hypotension, de phéochromocytome non traité, de rythme cardiaque trop lent.

Ce médicament peut provoquer des étourdissements. Afin de les éviter, veillez à ce que votre enfant se lève lentement.

Il est normal que le rythme cardiaque ralentisse sous l'effet du traitement, néanmoins en cas de pouls anormalement bas consultez votre médecin.

Chez le diabétique, les bêtabloquants peuvent masquer certains symptômes de l'hypoglycémie tels que les palpitations. Informez votre médecin si votre enfant est diabétique.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

### Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament ne doit pas être associé aux médicaments donnant des torsades de pointes (antiarythmique, certains antibiotiques...).

Informez votre médecin si votre enfant prend des diurétiques, des laxatifs ou tout autre médicament susceptible de provoquer une hypokaliémie.

Dans tous les cas, si votre enfant prend a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez le à votre médecin ou votre pharmacien.

## 3. COMMENT UTILISER *LE SOTALOL* ?

### Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

### Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE SOTALOL* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : maux de tête, étourdissements, fatigue, diarrhée, nausées, difficultés à respirer, modification du rythme cardiaque, crampes, sensation de mains et pieds froids.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER *LE SOTALOL* ?

### Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Conserver hors de portée des enfants.

### Péremption

3 mois