



Acénocoumarol

Date de création
19 Février 2018

Version 2

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE L'ACENOCOUMAROL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un antivitamine K (AVK) indiqué dans le traitement préventif et curatif des accidents thromboemboliques (thromboses veineuses profondes, cardiopathies emboligènes).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER L'ACENOCOUMAROL ?

Contre-indications et précautions d'emploi

L'acénocoumarol ne doit jamais être utilisé pendant la grossesse (risque de malformations, d'avortement spontané...) sauf pour les jeunes filles porteuses d'une valve cardiaque mécanique pour lesquelles il n'y a pas d'alternative thérapeutique plus efficace.

Les jeunes filles en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace.

Si votre fille est enceinte alors qu'elle est traitée par de l'acénocoumarol, vous devez consulter immédiatement un gynécologue afin de réaliser un diagnostic prénatal (échographie, IRM) et d'instaurer un suivi particulier de l'enfant.

En cas de nécessité de poursuite d'un traitement anticoagulant pendant la grossesse, le passage à l'héparine s'impose à partir de la 36^{ème} semaine d'aménorrhée.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux anticoagulants oraux et d'insuffisance hépatique grave.

Avant de décider l'instauration d'un traitement par AVK, une attention particulière sera portée à la compréhension du traitement par le patient ou ses parents (pour les enfants traités) en raison des contraintes liées au traitement.

L'enfant et ses parents doivent être informés et éduqués au bon suivi de son traitement. Il faut notamment insister sur la nécessité :

- de prendre son traitement sans oubli, tous les jours à la même heure ;
- d'effectuer régulièrement le contrôle biologique (INR), de préférence dans le même laboratoire ;
- d'être très vigilant sur les médicaments associés, qui peuvent perturber l'équilibre du traitement

En cas de chirurgie, d'extraction dentaire ou d'actes médicaux invasifs, il est nécessaire de prévenir le médecin de la prise d'acénocoumarol à cause du risque important d'hémorragie.

Pendant la durée du traitement, les injections intramusculaires ne peuvent être pratiquées qu'après avis médical, du fait d'un risque de saignement local. Les injections par voie sous-cutanée ou intraveineuse ne posent pas de problème.

Certaines activités ou sports violents peuvent entraîner des blessures. Leur pratique est déconseillée pendant la durée du traitement.

L'acénocoumarol est déconseillé en cas de risque hémorragique (ulcère gastroduodéal, hypertension artérielle...) et en cas d'insuffisance rénale sévère.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament ne doit pas être associé aux anticoagulants oraux, aux médicaments contenant de l'aspirine à fortes doses, de la phénylbutazone (toutes les formes y compris locales), du miconazole (par voie générale ou gel buccal, hors forme cutanée) (risque hémorragique) ou du millepertuis (diminution de l'effet anticoagulant et risque de thrombose).

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'ACENOCOUMAROL ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'ACENOCOUMAROL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : hémorragies, diarrhée, douleurs articulaires, chute de cheveux, réaction allergique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'ACENOCOUMAROL ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois