EasyPrep Pédiatrie	Amlodipine	Date de création 27 Février 2017
		Version 1
		Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE *L'AMLODIPINE* ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

Indications thérapeutiques
L'amlodipine est un médicament appartenant à la classe des inhibiteurs calciques fréquemment utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.
Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER *L'AMLODIPINE* ?

Contre-indications et précautions d'emploi
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : hypotension grave, sténose de la valve aortique, insuffisance cardiaque après un infarctus du myocarde.
Pensez à contrôler la tension artérielle de votre enfant de manière régulière.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons
Informez le médecin de votre enfant si vous prenez l'un des médicaments suivants : érythromycine, clarithromycine, vérapamil (Isoptine), diltiazem (Tildiem, Monotildiem), rifampicine, kétoconazole (Ketoderm) ou millepertuis. L'effet antihypertenseur peut en être diminué.
L'effet antihypertenseur peut être augmenté par certains médicaments tels que les alpha-bloquants (afluzosine (Xatral), prazosine (Alpress, Minipress)), les neuroleptiques ou le baclofène (Lioresal).
Le **jus de pamplemousse** peut augmenter les effets de ce médicament. Evitez de consommer du pamplemousse (jus ou fruit) pendant le traitement.

Si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER *L'AMLODIPINE* ?

Instructions pour un bon usage
Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.
Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement
Voie orale.
Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.
En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, *L'AMLODIPINE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : somnolence, vertiges, maux de tête (en particulier en début de traitement), palpitations, rougeur du visage, bouffées de chaleur, douleurs abdominales, nausées, jambes enflées, fatigue.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER *L 'AMLODIPINE* ?

Conditions de conservation
Conserver à température ambiante.
Conserver au sec.
Tenir hors de portée des enfants.

Péremption
3 mois