



## Cholestyramine

Date de création  
30 Avril 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 1. QU'EST-CE QUE LA *CHOLESTYRAMINE* ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

#### Indications thérapeutiques

La cholestyramine est indiquée dans le traitement des hypercholestérolémies persistantes lorsqu'un régime adapté s'est révélé insuffisant. Il permet d'abaisser le taux de cholestérol dans le sang en favorisant son élimination par l'intestin.

La poursuite du régime reste indispensable.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LA *CHOLESTYRAMINE* ?

#### Contre-indications et précautions d'emploi

La cholestyramine est contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique, de blocage des voies biliaires ou de constipation chronique.

Le respect du régime alimentaire prescrit par le médecin reste indispensable malgré la prise de la cholestyramine.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

#### Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament peut diminuer l'absorption d'autres médicaments, en particulier ceux qui contiennent des acides biliaires (acide chénodésoxycholique, acide ursodésoxycholique), des anticoagulants oraux, des digitaliques ou des hormones thyroïdiennes. Un délai de 2 heures minimum doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

### 3. COMMENT UTILISER LA *CHOLESTYRAMINE* ?

#### Instructions pour un bon usage

La cholestyramine ne doit pas être prise sous forme sèche.

Il est conseillé d'ouvrir les gélules et de mélanger leur contenu avec un peu d'eau, de lait ou de jus de fruit. Remuer pour obtenir une suspension uniforme. La suspension peut être préparée la veille et être conservée au réfrigérateur. Une bonne préparation facilite la prise de ce médicament.

#### Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LA *CHOLESTYRAMINE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : contipation, douleurs abdominales, éructations, brûlures de l'estomac, diarrhée, ballonnement intestinal, nausées, vomissements.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER LA *CHOLESTYRAMINE* ?

#### Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver les gélules à température ambiante. Une fois sous forme de suspension, la conserver au réfrigérateur.

#### Péremption

3 mois