

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LE CLOPIDOGREL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Le *CLOPIDOGREL* est un antiagrégant plaquettaire. Il est destiné à réduire la formation de caillots en empêchant les plaquettes de s'agglutiner (thromboses).

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE CLOPIDOGREL ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué en cas :

- D'insuffisance hépatique sévère,
- D'ulcère gastroduodéal ou d'hémorragie intracrânienne (risque important d'hémorragie),
- D'allergie au clopidogrel.

Comme ce médicament fluidifie le sang, le temps de saignement est susceptible d'être allongé en cas de blessure ou de traumatisme.

Une NFS (prise de sang) doit être rapidement envisagée chaque fois que des signes cliniques évocateurs de saignement surviennent pendant le traitement (exemples : saignement du nez ou des gencives, présence de sang dans les urines ou les selles).

Si votre enfant doit subir une intervention chirurgicale ou un acte de chirurgie dentaire, signalez la prise de ce médicament à l'anesthésiste ou au dentiste. Il pourra être décidé en accord avec le médecin qui suit votre enfant de suspendre le traitement quelques jours afin de limiter le risque de saignements.

La prise de clopidogrel n'empêche pas votre enfant de pratiquer un sport. Cependant, les sports sans contact physique seront privilégiés afin d'éviter tout traumatisme ou blessure susceptible d'entraîner des saignements.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Le risque de saignement sera augmenté en cas d'utilisation concomitante du clopidogrel avec d'autres antiagrégants plaquetitaires tels que l'**aspirine**.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (**ibuprofène**) peuvent provoquer des saignements du tube digestif qui peuvent être aggravés par le clopidogrel.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE CLOPIDOGREL ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE CLOPIDOGREL* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : saignements, hématomes, diarrhées, douleurs abdominales. Des cas de purpura thrombopénique thrombotique (trouble rare mais parfois grave) ont déjà été observés chez des patients traités par du clopidogrel : en cas de survenue d'une fièvre, de troubles de la conscience, de petites taches rouges sous la peau, d'une fatigue intense, consultez rapidement le médecin qui suit votre enfant.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE CLOPIDOGREL ?

Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Péremption

3 mois