



Clorazépate dipotassique

Date de création
14 Mai 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LE CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

1.1 Indications thérapeutiques

Le Clorazépate dipotassique est une benzodiazépine utilisée comme anxiolytique dans le traitement de certaines manifestations anxieuses sévères. Il est également utilisé dans le traitement de l'épilepsie. Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE ?

2.1 Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique grave, d'insuffisance respiratoire grave ainsi qu'en cas de myasthénie (maladie neuromusculaire auto-immune).

L'utilisation prolongée des benzodiazépines peut entraîner une dépendance, même aux doses thérapeutiques prescrites pour votre enfant par son médecin.

Si votre enfant arrête brutalement son médicament, ceci peut entraîner ce qu'on appelle un syndrome de sevrage dont les symptômes sont les suivants : réapparition de l'anxiété, agitation, irritabilité, insomnie, maux de tête, douleurs musculaires, tremblements. Les doses doivent donc être diminuées progressivement et toujours en accord avec le médecin de votre enfant.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

2.2 Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Ce médicament peut induire une somnolence qui peut être augmentée par la prise simultanée d'autres médicaments sédatifs.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE ?

3.1 Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

3.2 Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

4.1 Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LE CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : maux de tête, fatigue, somnolence, sensation de faiblesse musculaire, vision double, éruption cutanée, amnésie rétrograde, confusion des idées, augmentation de l'anxiété, agitation, agressivité, confusion, hallucinations.

Certains de ces troubles peuvent entraîner l'arrêt du traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE ?

5.1 Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

5.2 Péremption

3 mois