Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE *LE METHOTREXATE* ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Indications thérapeutiques
Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde active et du psoriasis grave.
Traitement d'entretien des leucémies aigues lymphoblastiques.
Ce médicament peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER *LE METHOTREXATE* ?

Contre-indications et précautions d'emploi
Une surveillance biologique (NFS) est nécessaire. Des prises de sang seront donc prescrites de manière fréquente à votre enfant.

Il est rappelé que le rythme de prise du méthotrexate est **hebdomadaire** (une fois par semaine). En effet, il existe un risque d'effets indésirables graves d'évolution parfois fatale lors de la prise quotidienne de méthotrexate.
Pour vous aider dans la bonne observance de votre traitement, votre pharmacien va vous remettre un feuillet d'aide à la prise du médicament.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons
Le méthotrexate ne doit pas être associé aux salicylés (aspirine), AINS, sulfaméthoxazole ainsi qu'à la triméthoprime car ils augmentent le risque d'anomalie de la numération formule sanguine.
Le méthotrexate ne doit pas être associé à la phénytoine car il augmente le risque de survenue de convulsions.
Le méthotrexate est CONTRE INDIQUE en association avec le vaccin contre la fièvre jaune et est déconseillé avec les autres vaccins vivants atténués.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER *LE METHOTREXATE* ?

Instructions pour un bon usage
Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement
Voie orale.
Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.
Il est rappelé que la prise du méthotrexate par voie orale doit s'effectuer **une seule fois par semaine** qu'elle que soit l'indication.
En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.
Si votre enfant a pris de gélules qu'il n'aurait pas dû, appelez le 15.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, *LE METHOTREXATE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : inflammation de la muqueuse buccale, anémie, nausées, douleurs abdominales, perte d'appétit, malaise, fatigue, frissons, fièvre, diminution de la résistance aux infections, anomalie de la NFS.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER *LE METHOTREXATE ?*

Conditions de conservation
Conserver à température ambiante.
Conserver dans un endroit sec.
Tenir hors de portée des enfants.

Péremption
3 mois

FEUILLETS À REMETTRE AUX PATIENTS

MÉTHOTREXATE

MODALITÉS DE PRISE DES COMPRIMÉS

A l'attention des patients traités par méthotrexate par voie orale

Plusieurs patients sous méthotrexate ont pris leurs comprimés tous les jours au lieu d'**une seule fois par semaine**. Ce type d'erreur est dangereux : il conduit à un surdosage qui peut provoquer des effets indésirables graves, pouvant être d'issue fatale.

MÉTHOTREXATE
VOIE ORALE
Une prise
1 jour par semaine

1. Soyez vigilants et respectez strictement la prise 1 seule fois par semaine (prise unique).
2. Si ce n'est pas déjà fait, discutez avec votre médecin du jour qui vous convient le mieux.
3. Demandez à votre pharmacien de l'indiquer sur la boîte de votre médicament ou sur cette fiche.
4. Pour éviter toute erreur sur le jour de prise, reportez aussi la date dans votre agenda ou sur un calendrier.

A REMPLIR PAR VOTRE PHARMACIEN
(cette fiche est à conserver avec votre traitement) :

NOM DU MÉDICAMENT PRESCRIT :
.....

Dose par semaine (mg)	
Nombre de comprimé(s) PAR SEMAINE EN 1 PRISE UNIQUE	

COCHEZ LE JOUR DE PRISE DES COMPRIMÉS **(ET UNIQUEMENT 1 JOUR PAR SEMAINE) :**

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
Nombre de comprimé(s)							

Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre médecin ou un service médical d'urgences (15).

SYMPTÔMES LIÉS AU SURDOSAGE

Un surdosage peut se traduire par un ou plusieurs des symptômes suivants : ecchymoses (bleus) ou saignements inexpliqués, fatigue inhabituelle, fièvre, plaies ou inflammation de la bouche, nausées, vomissements, diarrhées sévères, selles foncées ou sang dans les selles.

Pour toute question ou pour plus d'information, consultez la notice présente dans la boîte ou contactez votre médecin ou votre pharmacien.

DOCUMENT VALIDÉ PAR L'ANSM

NORDIC PHARMA Pfizer SANOFI