



Oxcarbazépine

Date de création
10 Aout 2017

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE L'OXCARBAZEPINE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un antiépileptique indiqué dans le traitement des épilepsies partielles en monothérapie ou en association avec d'autres antiépileptiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER L'OXCARBAZEPINE ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Des réactions d'hypersensibilité immédiate incluant éruptions cutanées, démangeaisons, urticaire, gonflement de la gorge et des lèvres ainsi que des réactions allergiques ont été rapportées lors de la post-commercialisation du Trileptal®. En cas d'apparition de ces signes, le traitement doit être interrompu et votre médecin consulté afin de mettre en place un traitement alternatif pour votre enfant.

Si votre enfant souffre d'une maladie cardiaque, d'un essoufflement ou d'un gonflement des pieds et des jambes dû à une rétention de liquides, consultez le médecin qui le suit. Le poids de votre enfant sera surveillé afin de détecter une rétention d'eau.

Le traitement par l'oxcarbazépine doit être arrêté progressivement pour diminuer le risque d'augmentation de la fréquence des crises épileptiques.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Si votre enfant prend des médicaments diminuant le taux de sodium dans le sang (certains diurétiques ou anti-inflammatoires), son taux de sodium devra être contrôlé de manière régulière.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'OXCARBAZEPINE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'OXCARBAZEPINE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : fatigue, vertiges, maux de tête, somnolence, nausées, vomissements, troubles de l'accommodation, agitation, confusion, tremblements, douleurs abdominales.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'OXCARBAZEPINE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois