

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE LE TOPIRAMATE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Traitement de certaines formes.

Traitement de fond de la migraine chez l'adulte.

Il peut cependant être indiqué dans d'autres pathologies, demandez au médecin qui suit votre enfant.

Modalités de prescription

Le topiramate est une molécule à **usage restreint**, ce qui signifie qu'il est interdit de réaliser des préparations à base de topiramate chez l'enfant de plus de 12 ans ainsi que chez l'adulte sauf pour ceux souffrant de dénutrition ou de troubles de la déglutition après attestation médicale afin de réaliser une adaptation galénique et/ou posologique dans le cadre de l'AMM.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE TOPIRAMATE ?

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Le topiramate ne doit pas être utilisé en association avec le millepertuis (risque de diminution de l'effet antiépileptique).

3. COMMENT UTILISER LE TOPIRAMATE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE TOPIRAMATE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : nausées, diarrhées, perte de poids, perte d'appétit, dépression, fourmillement, somnolence, vertiges, douleurs abdominales, anémie, désorientation, agressivité, agitation, acidose, calculs des voies biliaires.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE TOPIRAMATE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois