



Valaciclovir

Date de création
30/07/2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LE VALACICLOVIR ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Le valaciclovir est indiqué dans le traitement de l'herpès et de la varicelle.

Il peut cependant être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE VALACICLOVIR ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Le valaciclovir peut entraîner une insuffisance rénale. Une bonne hydratation est recommandée pendant le traitement.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Le valaciclovir doit être utilisé avec la plus grande prudence lorsqu'il est associé avec d'autres médicaments néphrotoxiques et surtout si votre enfant souffre déjà d'une insuffisance rénale.

C'est le cas lors de l'administration simultanée avec des antibiotiques de la famille des aminosides, les produits de contraste iodés, les organoplatines, le méthotrexate, la ciclosporine, le tracrolimus, le foscarnet et la pentamidine.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE VALACICLOVIR ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LE VALACICLOVIR est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : maux de tête, vertiges, nausées, vomissements, diarrhées, éruption cutanée, photosensibilisation, démangeaisons.

Troubles neurologiques parfois graves en cas de surdosage (confusion, agitation, hallucinations, convulsions).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE VALACICLOVIR ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois